



Aplikovaná dávka Fentalis Akut 100 / 200 / 300 µg - datum / čas / síla	Činnost, při které se průlomová bolest objevila	Místo bolesti na těle	Opakovaná dávka ano/ne; Pokud ano: čas

FEN/2022/08/501663/01

Vedte si, prosím, záznam o tom, kdy a kolik tablet přípravku Fentalis Akut jste použil(a). Pomůže to Vám i Vašemu lékaři ověřit správnost léčby.

Pokud Vám zbývají 4 a méně tablet, obraťte se, prosím, bez prodlení na Vašeho ošetřujícího lékaře tak, aby byla i nadále zajištěna dostatečná kontrola Vaší průlomové bolesti.

Během titrace dávky je možné, abyste pro jakoukoli jednotlivou dávku užívali násobky tablet s obsahem 100 mikrogramů a/ nebo 200 mikrogramů. V jedné chvíli nesmí být užito více než čtyři (4) tablety.

Je důležité, abyste používali přípravek Fentalis Akut k léčbě maximálně 4 příhod průlomové bolesti denně. Jednotlivé příhody průlomové bolesti by neměly být léčeny více než 2 dávkami, které užijete po 15–30 minutách a pouze v případě, že první tableta nevedla k dostatečné úlevě bolesti.

SANDOZ s.r.o., Gemini, budova B, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4
tel.: +420 225 775 111, web: www.sandoz.cz, e-mail: office.cz@sandoz.com

Schváleno SÚKLem dne



Záznamová karta přípravku **Fentalis Akut**

100 / 200 / 300 mikrogramů

30 sublingválních tablet

Škála intenzity bolesti

od 0 (žádná) do 10 (nejhorší bolest)

Žádná bolest  Nejhorší bolest