

### DŮLEŽITÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU DROVELIS A RIZIKU KREVNÍCH SRAŽENIN

Všechny přípravky kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Drovelis, zvyšují riziko tvorby krevní sraženiny. Celkové riziko krevní sraženiny v důsledku užívání přípravku Drovelis je malé, ale sraženiny mohou být závažné a ve velmi vzácných případech mohou být i smrtelné.

Je velmi důležité, abyste rozpoznala, kdy můžete mít větší riziko krevní sraženiny, jaké známky a příznaky je třeba sledovat a co musíte udělat.

#### V jakých situacích je riziko krevní sraženiny nejvyšší?

- v prvním roce užívání přípravku Drovelis (včetně opětovného zahájení užívání po pauze trvající 4 týdny nebo déle);
- pokud máte velkou nadváhu;
- pokud je Vám více než 35 let;
- pokud máte přímého příbuzného, který(á) někdy měl(a) krevní sraženinu v relativně mladém věku (např. do 50 let);
- pokud jste porodila v předchozích několika týdnech.

Pokud kouříte a je Vám více než 35 let, je důrazně doporučeno přestat kouřit nebo používat nehormonální metodu antikoncepce.

#### Vyhleďte ihned lékaře, pokud se u Vás objeví některé z následujících příznaků:

- Silná bolest nebo otok dolní končetiny, které mohou být doprovázeny citlivostí, zvýšenou teplotou nebo změnami barvy kůže, jako je zblednutí, zarudnutí nebo zmodráání. **Můžete mít hlubokou žilní trombózu.**
- Náhlá nevysvětlitelná dušnost nebo rychlý dech; silná bolest na hrudi, která se může zvětšovat při hlubokém dýchání; náhlý kašel bez zřejmé příčiny (s možností vykašlávání krve). Můžete mít závažnou komplikaci hluboké žilní trombózy nazývanou **plicní embolie**. K tomu dochází, když se krevní sraženina dostane z nohy do plic.
- Bolest na hrudi, často akutní, ale někdy pouze nepříjemný pocit, tlak, tíha na hrudi, nepříjemný pocit v horní polovině těla vyzařující do zad, čelisti, krku, paže spolu s pocitem plnosti související s poruchou trávení nebo dušením, pocení, nevolnost, zvracení nebo závrať. Můžete mít **srdeční záchvat**.
- Slabost nebo necitlivost v obličeji, paži nebo noze, zvláště na jedné straně těla; problémy s mluvením nebo porozuměním; náhlá zmatenost; náhlá ztráta zraku nebo rozmazané vidění; silná bolest hlavy/migréna, která je horší než normálně. Můžete mít **cévní mozkovou příhodu (mrtvici)**.

#### Sledujte příznaky krevní sraženiny, zvláště pokud:

- jste právě prodělala operaci;
- jste byla dlouhodobě nepohyblivá (např. kvůli zranění nebo onemocnění nebo jestliže máte dolní končetinu v sádře);
- jste dlouho cestovala (déle než 4 hodiny).

#### Nezapomeňte informovat svého lékaře, zdravotní sestru nebo chirurga, že užíváte přípravek Drovelis, pokud:

- se chystáte na operaci nebo jste podstoupila operaci;
- jste dotázána zdravotnickým pracovníkem, zda užíváte nějaký lék.

Další informace najdete v příbalové informaci nebo na webových stránkách [www.sukl.cz](http://www.sukl.cz).

Pokud máte podezření na výskyt nežádoucího účinku v souvislosti s užíváním kombinované hormonální antikoncepce, můžete ho nahlásit svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, [www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek](http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek)

