

Změny, které mají být vloženy do příslušných bodů informací o přípravku (nový text podtržený a tučně, vymazaný text ~~přeskrtnutý~~)

Souhrn údajů o přípravku

- Bod 4.2

Způsob podání

[...]

Při použití nazolakrimální okluze nebo zavření očí po dobu 2 minut se systémová absorpce snižuje. Tím může dojít ke snížení systémových nežádoucích účinků a zvýšení lokálního účinku.

- Bod 4.8

Následující nežádoucí účinky mají být doplněny pod **třídu orgánových systémů (SOC) srdeční poruchy** s frekvencí *není známo*:

Tachykardie****

****nežádoucí účinky pozorované u dorzolamidu

Následující nežádoucí účinky mají být doplněny pod **třídu orgánových systémů (SOC) cévní poruchy** s frekvencí *není známo*:

Hypertenze****

****nežádoucí účinky pozorované u dorzolamidu

Příbalová informace

- Bod 3

Návod k použití

[...]

Zavřete oko a stlačte vnitřní koutek oka prstem asi na 2 minuty. Toto opatření napomůže tomu, aby se přípravek nedostal do celého těla.

- Bod 4

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

Zvýšená srdeční frekvence (s touto frekvencí pozorováno u dorzolamidu)

Zvýšený krevní tlak (s touto frekvencí pozorováno u dorzolamidu)