

▼ ZEPOSIA® (ozanimod)

Těhotenská pacientská karta

(pro ženy, které mohou otěhotnět)

Důležité kontaktní informace

Ošetřující lékař:

Telefon:

Adresa pracoviště:

Zeposia se nesmí užívat během těhotenství a u žen, které by mohly otěhotnět a neužívají účinnou antikoncepci!

Těhotenský test musí být prováděn před zahájením a pravidelně v průběhu léčby pod dohledem ošetřujícího lékaře.

Lékař Vám poskytne poradenství ohledně teratogenního rizika (možnost vzniku vrozené vývojové vady) a potřebných opatření k jeho zmenšení.

Účinnou antikoncepci musíte používat během léčby a nejméně 3 měsíce po jejím ukončení, stejně jako před plánovaným otěhotněním.

Ihned informujte svého lékaře, pokud jste těhotná, kojíte, nebo pokud se domníváte, že byste mohla být těhotná, nebo plánujete otěhotnět.

Informujte ihned svého lékaře, pokud během léčby otěhotníte. Lékař léčbu přeruší a poskytne Vám poradenství ohledně rizika účinků na plod a provede ultrazvukové vyšetření.

V případě přerušení léčby z důvodů těhotenství se Vaše onemocnění může znovu objevit.