

Změny, které byly schváleny v příslušných bodech informací o přípravku léčivých přípravků obsahujících léčivou látku lisdexamfetamin (vymazaný text ~~přeškrtnutý~~, nový text **podtržený a tučně**).

## SmPC

### Bod 4.8 Nežádoucí účinky

Cévní poruchy	Raynaudův fenomén	Méně časté	Není známo	Není známo
	<b><u>Epistaxe</u></b>	<b><u>Méně časté</u></b>	<b><u>Méně časté</u></b>	<b><u>Méně časté</u></b>

## Příbalová informace

### Bod 3 Jak se přípravek Elvanse užívá

#### Jestliže jste užil(a) více přípravku Elvanse, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) příliš přípravku, poraďte se s lékařem nebo si okamžitě zavolejte sanitku. Řekněte jim, kolik přípravku jste užil(a).

Známky předávkování mohou zahrnovat: neklid, třes, zvýšené nekontrolovatelné pohyby, svalové záškuby, zrychlené dýchání, zmatenost, sklon přit se nebo hádat, vidění, cítění nebo slyšení věcí, které nejsou skutečné (halucinace), panický stav, vysokou horečku nebo rozpad svalů. Může následovat únava a deprese. **Také se může objevit pocit na zvracení nebo zvracení, průjem a křeče v břiše.** Mohou být pozorovány změny srdečního tepu (pomalý, rychlý nebo nepravidelný), vysoký nebo nízký krevní tlak, oběhové selhání, epileptické záchvaty a kóma (hluboké bezvědomí). ~~Může se také objevit pocit na zvracení nebo zvracení, průjem a křeče v břiše.~~

### Bod 4 Možné nežádoucí účinky

#### Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

- nadměrné mluvení,
- pocity deprese, úzkosti, zmaru nebo nejistoty (dysforie),
- pocit nadměrného štěstí nebo vzrušení (euforie),
- nadměrné škrábání (mačkání) kůže,
- nekontrolovatelné záškuby nebo cukání těla,
- svědění, vyrážka nebo vyvýšená červená svědivá vyrážka (kopřivka),
- rozmazané vidění,
- nadměrné rozšíření zornic očí,
- špatný krevní oběh, což způsobuje znečitlivění a bledost prstů rukou i nohou (Raynaudův fenomén),
- vysoký krevní tlak,
- kovová chuť nebo změny chuti (dysgeuzie),
- mdloby,
- **krvácení z nosu.**