

CZ-KEY-00999

**KEYTRUDA<sup>®</sup>**  
**(pembrolizumab)**

**KARTA  
PACIENTA**

# KEYTRUDA® (pembrolizumab)

Může způsobit vážné nežádoucí účinky, které někdy mohou být život ohrožující a mohou vést k úmrtí. Mohou se objevit kdykoli v průběhu nebo po ukončení léčby. Ve stejnou dobu Vás může postihnout i více nežádoucích účinků.

**Ohrožení životem:** Ihned kontaktujte svého lékaře, pokud se u Vás objeví jakékoli příznaky včetně těch, které nejsou uvedeny na této kartě. Lékař Vám může dát jiné léky, aby zabránil závažným následkům, odložit další dávku přípravku nebo léčbu ukončit.

Další údaje naleznete v příbalové informaci k přípravku KEYTRUDA v databázi léků na stránce [www.olecich.cz](http://www.olecich.cz).

## DŮLEŽITÉ

- Nepokoušejte se nežádoucí účinky léčit sami.
- Léčbu neukončujte bez souhlasu lékaře.
- **Tuto kartu noste stále s sebou**, zvláště pokud cestujete, kdykoli jdete na pohotovost nebo když musíte navštívit jiného lékaře.
- Nezapomeňte uvědomit každého zdravotnického pracovníka, kterého navštívíte, že se léčíte přípravkem KEYTRUDA, a ukažte mu tuto kartu.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, včetně nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: <http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek>.

## Karta pacienta

### Plíce

- Dušnost
- Bolest na hrudi
- Kašel

### Střeva

- Průjem nebo častější vyprazdňování střev, než je obvyklé
- Tmavá, dehtovitá, lepkavá stolice nebo stolice s krví nebo hlenem
- Silná bolest břicha nebo citlivost

### Játra

- Pocit na zvracení nebo zvracení
- Menší pocit hladu
- Bolest na pravé straně břicha
- Zežloutnutí kůže nebo bělma očí
- Tmavá moč
- Krvácení nebo snadnější tvorba modřin, než je obvyklé

### Ledviny

- Změny množství nebo barvy moči

### Žlázy s vnitřní sekrecí

- Rychlý tep srdce
- Snížení nebo zvýšení tělesné hmotnosti
- Zvýšené pocení
- Vypadávání vlasů
- Pocit chladu
- Zácpa
- Hlubší hlas
- Bolesti svalů
- Závrat' nebo mdloby
- Bolest hlavy, která nemizí, nebo neobvyklá bolest hlavy

### Cukrovka typu 1, včetně diabetické ketoacidózy

- Silnější pocit hladu nebo zjizně
- Častější potřeba močení
- Snížení tělesné hmotnosti
- Pocit únavy nebo nevolnosti
- Bolest břicha
- Rychlé a hluboké dýchání
- Zmatenost
- Neobvyklá ospalost
- Sladký zápach dechu
- Sladká nebo kovová chuť v ústech
- Jiný zápach moči nebo potu

## Důležité kontaktní informace

Jméno  
lékaře:

Telefon  
do ordinace: .....

Telefon  
po ordinčních  
hodinách: .....

Moje  
jméno:

Můj  
telefon: .....

Kontakt pro naléhavé  
situace (jméno a telefon): .....

Pokud máte jakékoli otázky k přípravku KEYTRUDA nebo k jeho fungování, obraťte se na svého lékaře.

## Důležité informace pro zdravotnické pracovníky

Tento pacient je léčen přípravkem KEYTRUDA (pembrolizumab), který může vyvolat imunitně zprostředkované nežádoucí účinky, které se mohou objevit kdykoli během léčby nebo i po jejím ukončení. Včasná diagnóza a příslušná léčba jsou nezbytné pro jejich minimalizaci.

Konzultace s onkologem nebo jiným specialistou může být nápomocná pro zvládnutí orgánově specifických imunitně zprostředkovaných nežádoucích účinků.

Pro další detailnější informace k přípravku (SmPC) navštivte databázi léků na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv: <https://www.sukl.cz/>.