

Duodopa SC[®]

(foslevodopa/foskarbidopa)

k léčbě pokročilé Parkinsonovy nemoci.

Tato příručka pro pacienty obsahuje důležité bezpečnostní informace, o kterých byste měl(a) vědět.

**Mějte prosím tuto příručku k dispozici,
když se chystáte použít tento lék.**

CZ-PRODD-230011

abbvie

Proč bych si měl(a) tuto příručku přečíst?

Duodopa SC® se používá k léčbě příznaků pokročilé Parkinsonovy nemoci.

Tento přípravek se používá v případě, kdy jiné léky k léčbě příznaků tohoto onemocnění již neúčinkují tak dobře jako dříve.

Vy nebo Váš ošetřovatel Vám bude podávat tento lék pod kůži pomocí malé plastové jehličky (kanyly) do oblasti kolem pupku. Tato oblast je místem podání infuze.

Tento lék se dostává do těla prostřednictvím kanyly nepřetržitě 24 hodin denně.

Někteří pacienti používající tento lék mohou mít následující kožní problémy v místech, kde se kanyla zavádí do těla:

- **Kožní infekce:** Nastává v případech, kdy se bakterie dostanou do kůže. Kožní infekce se může stát vážnou, když se bakterie dostanou do krve a rozšíří se po celém těle. Tomu se říká sepsa.
- **Kožní reakce:** Nastává, když je pokožka podrážděná/zanícená.

Tato příručka pro pacienty pomůže Vám a Vašemu ošetřovateli pochopit:



Jak si vybrat místo pro podání infuze



Jak rozpoznat kožní infekci nebo kožní reakci v místě podání infuze



Co můžete udělat, abyste snížil(a) riziko infekce nebo podráždění v místě podání infuze



Co dělat v případě, že se objeví infekce nebo podráždění v místě podání infuze



Kde najdete více informací o Vašem léku



Jak si vybrat místo pro podání infuze

Je důležité pravidelně měnit místo podání infuze. Díky tomu zůstane Vaše kůže zdravá a také to umožní správné podání léku.

Jako místo podání infuze můžete použít břišní oblast, pokud Vám lékař neřekne, abyste použil(a) jiné místo. Ujistěte se, že místo, které si pro podání vyberete, je vzdáleno od pupku alespoň 5 cm (asi na délku malíčku).


- Vyhýbejte se linii nošení pásku, protože tato oblast může být podrážděná tlakem pásku na kůži.
- Vyhýbejte se pokožce, která je zjizvená, ztvrdlá nebo pokrytá striemi.
- Vyhýbejte se jakýmkoli kožním záhybům nebo záhybům, kde se tělo přirozeně hodně ohýbá.
- Použijte nový infuzní set (kanyla/ hadička) při každé změně místa podání infuze.

Měňte místo podání každé 3 dny nebo dříve v závislosti na změnách na kůži (jako jsou zarudnutí, otok a bolest).

Nové místo podání musí být alespoň 2,5 cm (asi na dva prsty) vzdáleno od místa, které jste použil(a) naposledy.

Nepoužívejte znovu stejné místo podání alespoň 12 dnů – to pomůže, aby se Vaše pokožka zcela zahojila.

Existují různé způsoby, které Vám pomohou s tím, abyste použité místo podání infuze nepoužil(a) znovu příliš brzy. Jedním ze způsobů je si představit, že Vaše břicho jsou hodiny. Kanylu můžete zavádět pokaždé v jiném „dvouhodinovém“ intervalu. Můžete začít na 12. hodině, pokračovat na 2. hodině, poté na 4. hodině a tak dále.




Abyste měl(a) přehled o aplikaci, запиšte si datum a místo podání infuze.



Jak rozpoznat kožní infekci nebo kožní reakci v místě podání infuze

Všímejte si změn na pokožce tam, kde je kanyla zavedena do kůže. Kožní změny se mohou objevit spolu s horečkou nebo bez ní a zahrnují:

- zarudnutí
- pokožku teplou na dotek
- otok
- citlivost/bolest
- změny barvy pokožky, když na ni zatlačíte





Co můžete udělat, abyste snížil(a) riziko infekce nebo podráždění v místě podání infuze

V místě podání infuze se mohou objevit infekce nebo kožní reakce. Níže jsou uvedeny body, které je třeba zvážit při manipulaci s infuzí.



Pro přípravu infuze použijte dobře osvětlené místo, které je čisté a rovné (například stůl).



Při přípravě infuze udržujte místo podání infuze a infuzní set čisté a sterilní.



Vždy si umyjte ruce mýdlem a vodou a osušte je papírovou utěrkou. Potom se už nedotýkejte ničeho znečištěného.



Nedovolte, aby se hrot stříkačky, adaptér injekční lahvičky, hadička nebo konektor dotýkal znečištěného povrchu.



Opatrně zlikvidujte všechny použité materiály, které mohou být kontaminovány.



Když jste si vybral(a) místo podání infuze, otřete si pokožku tamponem s alkoholem. Dbejte na to, abyste si ji otíral(a) jedním směrem, abyste neznečistil(a) vydezinfikované místo. Nechte místo oschnout alespoň 1 minutu.

Měňte místo vpichu každé 3 dny nebo dříve v závislosti na změnách na kůži (jako jsou zarudnutí, otok a bolest).



Při výběru nového místa podání nepoužívejte stejné místo alespoň 12 dnů. To pomůže, aby se Vaše pokožka zcela zahojila.



Vždy dodržujte vzdálenost 2,5 cm (asi na 2 prsty) od místa, které jste použil(a) jako místo podání naposledy.



Při změně místa podání infuze vždy použijte novou kanylu a hadičku.



Ostříhejte si všechny chloupky kolem místa podání infuze nůžkami. Pomůže to kanyli se lépe přichytit k Vaší pokožce. Pokud si musíte pokožku v místě podání oholit, počkejte jeden den před použitím tohoto místa podání infuze.



Noste pohodlné oblečení, které nebude dráždit kůži v místě vpichu.



Co byste měl(a) dělat, pokud se objeví infekce nebo podráždění v místě podání infuze

**Změňte místo podání infuze – nečekejte 3 dny.
Kontaktujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo
lékárníka, pokud se u Vás objeví následující příznaky:**

- zarudnutí
- pokožka teplá na dotek
- otok
- citlivost/bolest
- změny barvy pokožky, když na ni zatlačíte

**Nepoužívejte infikované místo alespoň 12 dnů nebo
dokud se nezahojí.**



Kde najdete další informace o Vašem léku

Tento přehled nežádoucích účinků není úplný a je třeba se seznámit i s možnými dalšími nežádoucími účinky, jejichž výčet naleznete v příbalové informaci pro pacienta (PIL). PIL je distribuována v každém balení léčivého přípravku a lze ji také vyhledat na <http://www.olecich.cz> po zadání názvu léčivého přípravku pod zkratkou PIL. Více informací o Vašem léku naleznete také v návodu k použití (IFU), který je součástí Vašeho léku (foslevodopa/foskarbidopa). Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků (NÚ), sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli NÚ, které nejsou uvedeny v příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti o hlášení najdete na: <http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek>. Adresa pro zaslání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, odbor farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, email: farmakovigilance@sukl.cz. Tato informace může být také hlášena společností AbbVie na e-mail: safety-cz@abbvie.com.

CZ-PRODD-230011