

Lékař předepisující ZypAdheru
 (jméno, název a adresa zdravotnického
 zařízení, telefonní číslo)

Jméno: _____

Telefon: _____

Jméno: _____

Telefon: _____

**KDYKOLIV NAVŠTÍVÍTE LÉKAŘE NEBO SPECIALISTU (VČETNĚ NEHODY NEBO POHOTOVOSTI),
 ZKONTROLUJTE A DOPLŇTE S NÍM PROSÍM TENTO SEZNAM LÉKŮ.**

Předepsané léky Datum: _____

Název léku	Dávka <i>mg, jednotky, inhalace, kapky</i>	Kdy je užíváte? <i>Kolikrát za den? Ráno a večer? Po jídle?</i>	Datum <i>Začátek / Konec</i>	Důvod <i>Proč je užíváte?</i>

ZypAdhera

Dávka (<i>mg</i>)	Jak často dostáváte injekci?	Datum poslední injekce	Čas podání poslední injekce

INDIKACE
 ZypAdhera je určena pro udržovací
 léčbu schizofrenie u dospělých
 pacientů.

Pro důležité bezpečnostní informace se prosím podívejte na druhou stranu tohoto dokumentu a do příbalové informace přípravku ZypAdhera.





Podobně jako všechny léky, může mít i ZypAdhera nežádoucí účinky, které se ale nemusí projevit u každého.

Časté nežádoucí účinky: projevují se u jednoho až 10 pacientů ze 100

- ZypAdhera se může někdy dostat do krevního oběhu příliš rychle, což může vést k níže uvedeným nežádoucím účinkům. Toto riziko je spojeno s každou aplikací injekce. V některých případech mohou tyto příznaky vést až k poruše vědomí.
- Spavost
- Bolest v místě aplikace

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány u pacientů, kteří užívali olanzapin k vnitřnímu užití (ústy), ale může k nim dojít i po aplikaci ZypAdhery.

Velmi časté nežádoucí účinky: projevují se u 1 pacienta z 10

- Přibývání na váze
- Spavost
- Zvýšení hodnot hormonu prolaktinu v krvi

Časté nežádoucí účinky: projevují se u 1 až 10 pacientů ze 100

- Změny počtu některých krvinek a hladin tuků v krvi
- Zvýšení hladiny cukrů v krvi a v moči
- Pocit zvýšeného hladu
- Závratě
- Neklid
- Třes
- Svalová ztuhlost nebo křeče (včetně svalů ovládajících pohyby očí)
- Problémy s řečí
- Neobvyklé pohyby (obzvlášť obličeje a jazyka)
- Zácpa
- Sucho v ústech
- Vyrážka
- Slabost
- Silná únava
- Hromadění vody vedoucí k otokům rukou, kotníků nebo nohou
- Někteří nemocní mohou na počátku léčby pociťovat závratě nebo mít pocit na omdlení (s pomalou srdeční činností), obzvlášť při vstávání z lehu nebo sedu. Tyto pocity obvykle samy zmizí, v opačném případě to oznamte svému lékaři.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto dokumentu, sdělte to prosím svému lékaři.

Další informace o ZypAdheře najdete v Příbalové informaci pro uživatele.

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO PACIENTY

ZypAdhera se může někdy dostat do krevního oběhu příliš rychle. Pokud k tomu dojde, mohou se u vás objevit tyto příznaky: nadměrná ospalost, závratě, zmatenost, dezorientace, potíže s řečí, potíže s chůzí, ztuhlost nebo třes svalů, slabost, vznětlivost, agresivita, úzkost, zvýšení krevního tlaku nebo křeče, a může dojít až k bezvědomí.

Z tohoto důvodu:

- Po každé injekci Vás budou ve Vašem zdravotnickém zařízení sledovat minimálně 3 hodiny kvůli možným výše uvedeným příznakům.
- Po injekci a po pozorování byste neměl/a cestovat zpět do místa určení samotný/á.
- Než opustíte zdravotnické zařízení, Váš lékař nebo zdravotní sestra se musí ujistit, zda nemáte žádný z výše uvedených příznaků.
- Ačkoliv je to nepravděpodobné, mohou se tyto příznaky u Vás objevit i více než po 3 hodinách od injekce. Pokud by k tomu došlo, tak prosím ihned zkontaktujte svého lékaře nebo zdravotní sestru.
- Vzhledem k tomuto riziku prosím po zbytek dne po každé po injekci neřídte motorové vozidlo nebo neobsluhujte stroje.

Během svého pobytu ve zdravotnickém zařízení prosím informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud:

- cítíte nadměrnou ospalost
- pociťujete závratě
- cítíte se zmatený/á nebo desorientovaný/á
- cítíte se podrážděný/á nebo agresivní
- pociťujete úzkost
- máte problémy s řečí nebo chůzí
- pociťujete slabost
- cítíte svalovou ztuhlost nebo třes

Před vaším odchodem ze zdravotnického zařízení se musí Váš lékař nebo zdravotní sestra ujistit, že jste bdělý/á a že nemáte žádné příznaky. Měli by Vám také vysvětlit, co máte dělat, kdyby se příznaky objevily po Vašem odchodu.

Další informace o ZypAdheře najdete v Příbalové informaci pro uživatele.

INFORMACE O MÉ INJEKČNÍ LÉČBĚ

Jméno: _____

Adresa: _____

Telefon: _____

Kontakt pro případ nouze:
