

Karta pro pacienta

Přípravek Erivedge může poškodit Vaše nenarozené dítě, nebo může způsobit jeho úmrtí.

Pacientky (ženy), které mohou otěhotnět:

- musí v průběhu léčby a po dobu 24 měsíců po podání poslední dávky vždy používat **2 formy** doporučené antikoncepce (další informace viz brožurka „Program prevence početí: Informace pro pacienty užívající přípravek Erivedge“).
- podstupovat pravidelně každý měsíc v průběhu léčby těhotenský test ke sledování případného těhotenství.

Pacienti (muži):

- musí vždy používat prezervativ (nejlépe se spermicidem), pokud mají pohlavní styk s partnerkou v průběhu léčby nebo v průběhu 2 měsíců po jejím ukončení.
- nesmí v průběhu léčby nebo v průběhu 2 měsíců po jejím ukončení darovat sperma.

Pokud u Vás nebo Vaší partnerky dojde k vynechání menstruace, máte nebo Vaše partnerka má podezření na těhotenství nebo jste nebo Vaše partnerka je těhotná, musíte si vždy promluvit se svým lékařem.

- Pacientky (ženy): pokud máte podezření na těhotenství v průběhu léčby přípravkem Erivedge nebo v průběhu 24 měsíců po ukončení léčby, promluvte si se svým lékařem.
- Pacienti (muži): Pokud máte podezření, že Vaše partnerka otěhotněla v průběhu Vaší léčby přípravkem Erivedge, nebo v průběhu 2 měsíců po jejím ukončení, promluvte si se svým lékařem.

Všichni pacienti:

- nesmí podávat tento lék nikomu dalšímu.
- nesmí darovat krev v průběhu léčby a po dobu 24 měsíců po podání poslední dávky
- musí nepoužité tobolky vrátit po ukončení léčby do lékárny.

Kontaktní telefonní čísla

Ordinační hodiny	
Mimo ordinační hodiny	