


ZPŮSOB SKLÁDÁNÍ KARTY



KARTA / 90x70 mm

čelní strana (složená karta)



KARTA S UPOZORNĚNÍM PRO PACIENTA K PŘÍPRAVKU SIMPONI®

Pacient

Jméno:

Lékař

Jméno:

Telefonní číslo:

zadní strana (složená karta)

VAŠE PŘÍŠTÍ NÁVŠTĚVA

DATUM

HODINA

--	--

Merck Sharp & Dohme s.r.o., Evropská 2588/33a,
160 00 Praha 6, Česká republika
tel.: +420 233 010 111, www.msd.cz,
e-mail: dpoc_czechslovak@merck.com



rubové dvojstrany 1 (otevřená karta)

Tato karta s upozorněním pro pacienta obsahuje důležité bezpečnostní informace, které potřebujete vědět před léčbou přípravkem Simponi[®] i v jejím průběhu.

Ukažte tuto kartu každému lékaři, který Vás léčí.

DATA, KDY VÁM BYL PŘÍPRAVEK SIMPONI[®] PODÁN

1. podání:

/ /

Následná podání:

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

Požádejte svého lékaře, aby níže zaznamenal druh a datum
posledního/posledních vyšetření na TBC:

Vyšetření

Datum

/ /

Vyšetření

Datum

/ /

- Dbejte prosím také na to, abyste při každé návštěvě lékaře u sebe měl(a) seznam všech dalších léků, které užíváte.
- Noste tuto kartu u sebe po dobu 6 měsíců po poslední dávce přípravku Simponi[®], protože nežádoucí účinky se mohou objevit dlouho po Vaší poslední dávce přípravku Simponi[®].
- Přečtěte si prosím pečlivě příbalovou informaci k přípravku Simponi[®] před tím, než začnete tento lék používat.

rubové dvojstrany 2 (otevřená karta)

INFEKCE

Pokud se léčíte přípravkem Simponi[®], můžete se snadněji nakazit infekcemi. Infekce mohou postupovat rychleji a mohou být závažnější. Navíc se mohou znovu objevit některé dříve prodělané infekce.

Před léčbou přípravkem Simponi[®]

- Informujte svého lékaře, pokud máte nějakou infekci. Přípravkem Simponi[®] nesmíte být léčen(a), pokud trpíte tuberkulózou (TBC) nebo jinou závažnou infekcí.
- Měl(a) byste podstoupit vyšetření na TBC. Je velmi důležité, abyste informoval(a) svého lékaře, pokud jste někdy v minulosti trpěl(a) TBC nebo pokud jste byl(a) v blízkém kontaktu s někým, kdo měl TBC.
- Informujte svého lékaře, pokud víte nebo máte podezření, že jste nosičem viru hepatitidy B.

V průběhu a po ukončení léčby přípravkem Simponi[®]

- Neprodleně vyhledejte lékaře, pokud se u Vás objeví příznaky infekce, například horečka, únava, (přetrvávající) kašel, dušnost nebo chřipkové příznaky, úbytek tělesné hmotnosti, noční pocení, průjem, rány, problémy se zuby a pocit pálení při močení.

SRDEČNÍ SELHÁNÍ

Před léčbou přípravkem Simponi[®]

- Informujte svého lékaře, pokud jste měl(a) v minulosti srdeční selhání. Pokud trpíte středně těžkým až těžkým srdečním selháním, nesmíte být přípravkem Simponi[®] léčen(a).

V průběhu a po ukončení léčby přípravkem Simponi[®]

- Pokud se u Vás objeví příznaky srdečního selhání (např. dušnost nebo otoky nohou), vyhledejte ihned lékaře.