


Emerade®

adrenalin 150, 300, 500 mcg

Navštivte stránky
www.emerade.cz



- Shlédněte instruktážní video, jak použít adrenalinové pero Emerade®



- Zaregistrujte svoje pero Emerade® do služby "Upozornění na končící dobu použitelnosti"
- Získejte více informací o anafylaxi



Skladování

- Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem.
- Pravidelně kontrolujte roztok přes kontrolní okénko zvednutím štítku na těle pera, abyste se přesvědčili, že je čirý a bezbarvý. Pokud je roztok zabarvený nebo obsahuje sraženiny, zlikvidujte pero Emerade® a vyměňte ho za nové.
- Předplněné pero Emerade® je dodáváno ve speciálním plastovém obalu, který zajišťuje ochranu pera. V plastovém obalu je i instrukce k použití. Doporučujeme ponechat pero v originálním balení.



Snadné a bezpečné použití

- Emerade® má jediný velký otvor na jednom konci pera, který jasně indikuje, že otvor skrývá jehlu.
- Jehla je chráněna před, během i po podání injekce.



Když cestujete letadlem

- Mějte pero Emerade® ve svém příručním kabinovém zavazadle. Posádka letadla nemusí vědět, že pero je vaše léčebná pomůcka. Požádejte proto svého lékaře o vystavení potvrzení, které mějte při sobě.

Kdy vyměnit nepoužité pero za nové?

- Jako každý lék, tak i pero Emerade® je omezeno dobou použitelnosti.
- V případě, že své pero Emerade® nepoužijete, pak si ho musíte **vyměnit za nové před uplynutím doby použitelnosti**.
- Sledujte prosím dobu použitelnosti svého pera. Doba použitelnosti je uvedena na těle pera v poli „EXP“.



Kontaktujte svého lékaře před uplynutím doby použitelnosti kvůli výměně pera.

EDUKAČNÍ MATERIÁL

BROŽURA PRO PACIENTY

Emerade®

adrenalin 150, 300, 500 mcg

CO JE DOBRÉ VĚDĚT O PŘEDPLNĚNÉM PERU PRO INJEKČNÍ PODÁNÍ ADRENALINU?

PRO AKUTNÍ ZVLÁDNUTÍ ANAFYLAKTICKÉ REAKCE



JAK POUŽÍT PERO EMERADE® ?

Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci a v případě potřeby postupujte dle instrukcí na obalu pera.



Sejměte kryt jehly.



Zatlačte proti stehnu, držte 5 vteřin. Poté pero odložte. Jemně masírujte místo vpichu.

Poté zavolejte na tísňovou linku 155 a nahlašte, že se jedná o anafylaktickou reakci.

Pero Emerade® nemůže být použito znovu, bylo-li již jednou použito.

Pokud se po injekci stav nezlepší, pak může po 5-15 minutách následovat druhá injekce nepoužitým perem, pokud toto má pacient k dispozici. Konzultujte prosím tuto potřebu se svým lékařem.

KDY POUŽÍT PERO EMERADE® ?

Emerade® se používá k akutní léčbě závažných alergických reakcí (anafylaxe) způsobených potravinami, léky, hmyzím bodnutím a také reakcí vyvolaných námahou nebo neznámou příčinou.

Mezi obvyklé projevy patří:

- **Dýchací potíže**, sípání
- **Svědění**, zejména na rukou a hlavě
- **Bodavý pocit** v ústech
- **Otok** v ústech, krku, rtů nebo očí
- **Svědění, zarudnutí** nebo **kopřivka** kdekoli na těle
- **Závratě, zmatenost**
- **Bolesti břicha, nevolnost** nebo **zvracení**
- **Náhlá únava, snížení krevního tlaku** nebo **mdloby**
- **Dezorientace** nebo **ztráta vědomí**
- **Slabý puls**



Tyto projevy se mohou objevit rychle během několika minut nebo i v průběhu několika hodin po kontaktu s alergenem.



Velmi závažné projevy:

Těžce se vám dýchá, ústa nebo krk otékají, cítíte náhlou únavu a závratě. Máte kožní příznaky jako je zarudnutí, svědění, kopřivka. Tyto projevy se zhoršují.

Pozorujete-li tyto projevy, **použijte ihned pero Emerade®.**

Poté **zavolejte na tísňovou linku 155** a nahlašte, že se jedná o anafylaktickou reakci.

Adrenalin zvyšuje krevní tlak, stimuluje srdeční činnost a usnadňuje dýchání.

MĚJTE PERO EMERADE® VŽDY PŘI SOBĚ.



Pokud se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků.

Podrobnosti o hlášení najdete na: <http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek>

Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, e-mail: farmakovigilance@sukl.cz.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.