

TEXT KARTY PRO PACIENTA S JINÝM NEŽ ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM

<p><u>Karta pro pacienta s jiným než onkologickým onemocněním léčeného rituximabem</u></p> <p>Tato karta pro pacienta obsahuje důležité bezpečnostní informace, které byste měl(a) znát před zahájením léčby léčivým přípravkem obsahujícím rituximab.</p> <p><input type="checkbox"/> Ukažte tuto kartu každému lékaři, nejen svému ošetřujícímu specialistovi a také lékárníkovi, nebo zdravotní sestře, a při jakékoli návštěvě zdravotního zařízení.</p> <p style="text-align: center;">Infekce</p> <p>Rituximab může zvyšovat riziko vzniku infekcí.</p> <p style="text-align: center;">Před zahájením léčby rituximabem</p> <p><input type="checkbox"/> Léčba nesmí být zahájena, pokud trpíte závažnou infekcí nebo máte závažné problémy s imunitním systémem.</p> <p><input type="checkbox"/> UPOZORNĚTE SVÉHO LÉKAŘE, POKUD UŽÍVÁTE NEBO JSTE V MINULOSTI UŽÍVAL(A) LÉKY, JAKO JE CHEMOTERAPIE NEBO IMUNOSTUPRESIVA, KTERÉ BY MOHLY OVLIVNIT VÁŠ IMUNITNÍ SYSTÉM.</p> <p style="text-align: center;">V průběhu nebo po ukončení léčby rituximabem</p> <p style="text-align: center;">Pokud se u Vás rozvinou příznaky připomínající infekce, jako je například horečka, přetrvávající kašel, úbytek hmotnosti nebo apatie, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.</p> <p>U některých pacientů užívajících rituximab se velmi vzácně objevila závažná mozková infekce nazývaná progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML), která může vést k těžké invaliditě nebo úmrtí.</p> <p>Příznaky PML mohou zahrnovat poruchy paměti, poruchy myšlení, problémy s chůzí a/nebo poruchy či ztrátu vidění. V případě, že zaznamenáte kterýkoliv z těchto příznaků, informujte okamžitě svého lékaře.</p>	<p>Údaje o léčbě rituximabem</p> <p>Název užívaného léčivého přípravku (doplní lékař)</p> <p>-----</p> <p style="text-align: center;">První dávka:</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Poslední dávka:</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <ul style="list-style-type: none">• Více údajů naleznete v příbalové informaci přípravku, kterou lze vyhledat na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv v databázi léků http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php po zadání názvu přípravku• Mějte s sebou při každé návštěvě lékaře také seznam všech ostatních léků, které užíváte. <p>Jméno pacienta: _____</p> <p>Jméno lékaře : _____</p> <p>Telefon lékaře : _____</p> <p><input type="checkbox"/> VZHLEDEM K TOMU, ŽE OSLABENÍ IMUNITNÍHO SYSTÉMU ZPŮSOBENÉ RITUXIMABEM MŮŽE PŘETRVÁVAT PO DOBU NĚKOLIKA MĚSÍCŮ, MŮŽE DOJÍT K PROJEVŮM NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ I PŘESTO, ŽE LÉČBA BYLA UKONČENA. Z TOHOTO DŮVODU NOSTE, PROSÍM, TUTO KARTU U SEBE PO DOBU 24 MĚSÍCŮ PO POSLEDNÍ DÁVCE.</p>
--	--