

Pacientská kartička

Důležité bezpečnostní informace pro pacienty užívající přípravek Neotigason

Neotigason je určen k léčbě závažných kožních onemocnění. Obsahuje acitretin, který způsobuje závažné vrozené vady u potomků a je pomalu odstraňován z těla.

Pro ženy, které mohou otěhotnět	
Těhotenství	<ul style="list-style-type: none">• Nesmíte být těhotná při zahájení léčby, během léčby a po dobu 3 let od jejího ukončení.• Musíte užívat doporučenou antikoncepci během léčby a po dobu min. 3 let od jejího ukončení.
Pravidelné těhotenské testování	<ul style="list-style-type: none">• Před prvním i při dalším předepsání bude požadováno provedení těhotenského testu s negativním výsledkem.• Po ukončení léčby - jednou za 1-3 měsíce po dobu 3 let.
Kojení	<ul style="list-style-type: none">• Během léčby přípravkem Neotigason nesmíte kojit.
Konzumace alkoholu	<ul style="list-style-type: none">• Vyvarujte se alkoholu během léčby a po dobu 2 měsíců od ukončení léčby (týká se nápojů, jídla, ale také jiných <u>léků</u>).

Pro všechny pacienty a pacientky	
Darování krve	<ul style="list-style-type: none"> • Vyvarujte se darování krve během léčby a min. po dobu 3 let od ukončení léčby.
Neotigason a UV záření	<ul style="list-style-type: none"> • Používejte ochranný přípravek proti slunečnímu záření (OF alespoň SPF 15). Vyhněte se použití slunečních lamp a delšímu pobytu na slunci
Další léčivé přípravky a Neotigason	<ul style="list-style-type: none"> • Současné podávání methotrexátu, tetracyklinů, vitamínu A a jiných retinoidů s acitretinem je kontraindikováno. O vhodnosti současného užívání Neotigasonu s dalšími léky či doplňky výživy se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem!

Datum zahájení léčby: _____

Datum ukončení léčby: _____

Kontaktní údaje lékaře:

Ponechte si tuto kartičku pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Prosím, vždy ukažte tuto kartičku ošetřujícímu lékaři, případně lékárníkovi.