


## ZPŮSOB SKLÁDÁNÍ KARTY



KARTA / 90×70 mm

čelní strana (složená karta)



## KARTA PRO PACIENTA K PŘÍPRAVKU SIMPONI<sup>®</sup>

**Pacient**

Jméno: \_\_\_\_\_

**Lékař**

Jméno: \_\_\_\_\_

Telefonní číslo: \_\_\_\_\_

verze 02, schválena SUKL 09/2019

zadní strana (složená karta)

## VAŠE PŘÍŠTÍ NÁVŠTĚVA

DATUM	HODINA
_____	

09/2021-CZ-SUKL-00041

Státní ústav pro kontrolu léčiv,  
odbor farmakovigilance,  
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,  
email: farmakovigilance@sukl.cz

Podrobnosti o hlášení najdete na:  
<http://www.olecich.cz/hlaseni-prosukl/>  
nahlasit-nezadouci-ucinek

# rubové dvojstrany 1 (otevřená karta)

Tato karta pro pacienta obsahuje důležité bezpečnostní informace, které potřebujete vědět před léčbou přípravkem Simponi<sup>®</sup> i v jejím průběhu.

Ukažte tuto kartu každému lékaři, který Vás léčí.

## DATA, KDY VÁM BYL PŘÍPRAVEK SIMPONI<sup>®</sup> PODÁN

1. podání:

Následná podání:

Pokud si aplikujete přípravek Simponi<sup>®</sup> sám/sama, je důležité, abyste si poznamenal(a) číslo šarže a při nejbližší návštěvě sdělil(a) tuto informaci ošetřujícímu lékaři.

Požádejte svého lékaře, aby níže zaznamenal druh a datum posledního/posledních vyšetření na TBC:

Vyšetření		Vyšetření	
Datum	/ /	Datum	/ /
Výsledek		Výsledek	

- Dbejte prosím také na to, abyste při každé návštěvě lékaře u sebe měl(a) seznam všech dalších léků, které užíváte.
- Noste tuto kartu u sebe po dobu 6 měsíců po poslední dávce přípravku Simponi<sup>®</sup>, protože nežádoucí účinky se mohou objevit dlouho po Vaší poslední dávce přípravku Simponi<sup>®</sup>.
- Přečtěte si prosím pečlivě příbalovou informaci k přípravku Simponi<sup>®</sup> před tím, než začnete tento lék používat.

## rubové dvojstrany 2 (otevřená karta)

### INFEKCE

Pokud se léčíte přípravkem Simponi<sup>®</sup>, můžete se snadněji nakazit infekcemi. Infekce mohou postupovat rychleji a mohou být závažnější. Navíc se mohou znovu objevit některé dříve prodělané infekce.

#### Před léčbou přípravkem Simponi<sup>®</sup>

- Informujte svého lékaře, pokud máte nějakou infekci. Přípravkem Simponi<sup>®</sup> nesmíte být léčen(a), pokud trpíte tuberkulózou (TBC) nebo jinou závažnou infekcí.
- Měl(a) byste podstoupit vyšetření na TBC. Je velmi důležité, abyste informoval(a) svého lékaře, pokud jste někdy v minulosti trpěl(a) TBC nebo pokud jste byl(a) v blízkém kontaktu s někým, kdo měl TBC.
- Informujte svého lékaře, pokud víte nebo máte podezření, že jste nosičem viru hepatitidy B.

#### V průběhu a po ukončení léčby přípravkem Simponi<sup>®</sup>

- Neprodleně vyhledejte lékaře, pokud se u Vás objeví příznaky infekce, například horečka, únava, (přetrvávající) kašel, dušnost nebo chřipkové příznaky, úbytek tělesné hmotnosti, noční pocení, průjem, rány, problémy se zuby a pocit pálení při močení.

### TĚHOTENSTVÍ A VAKCINACE

- V případě, že Vám byl podán přípravek Simponi<sup>®</sup> v průběhu těhotenství, je důležité, abyste informovala dětského lékaře dříve, než bude Vašemu dítěti podána jakákoliv vakcína. Vaše dítě nemá být očkováno „živou vakcínou“, například BCG (používanou k prevenci tuberkulózy) během 6 měsíců od doby, kdy Vám byla v průběhu těhotenství podána poslední injekce přípravku Simponi<sup>®</sup>.