

Použití infuzního systému k aplikaci treprostinilu do žíly

Informace pro pacienty

Než začnete infuzi využívat doma, přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci a tuto brožuru.

Verze: 01
Schváleno SÚKL: 11/2019

Hlavní body

Než si začnete infuzi aplikovat sami doma, absolvujete zácvik v jejím provádění. Tuto metodu si musíte osvojit natolik, abyste ji pohodlně zvládli sami. Se zacvičením vám pomůže tato brožura. Vezměte si ji domů a uchovávejte na bezpečném místě. Můžete si v ní připomínat nejdůležitější informace. Mohou se s ní seznámit i členové Vaší rodiny nebo pečovatel.

Brožura začíná úvodním vysvětlením a základními pokyny k podávanému přípravku a infuznímu systému.

- Zásobník s lékem a infuzní hadičku vyměňujte denně (každých 24 hodin). Konektor s uzavřeným hrdlem měňte přinejmenším každých 7 dní.
- Výměnu infuzního systému provádějte rychle, aby nedošlo k přerušení dodávky přípravku.
- Nevysazujte lék, dokud vám to lékař nedoporučí.

Druhá část brožury radí, jak infuzní systém uchovávat v maximální možné čistotě. Pokud se do krve dostanou bakterie, může to způsobit vážné onemocnění.

- Denně kontrolujte, zda u vstupu hadičky do těla nejsou známky infekce.
- Chraňte všechny spoje systému před vlhkostí – voda často obsahuje bakterie.
- Infuzní systém nenamáčejte. Vyhneťte se plavání.
- Pravidelně si měňte krytí a čistěte pokožku pod ním. Sterilní průhledné krytí měňte alespoň každých 7 dní, gázové alespoň každý druhý den.

Pokud budete mít jakékoli dotazy, obraťte se kdykoli na svého lékaře či zdravotní sestru.

Obsah

1. Základní informace o léčbě	6
• Podávaný přípravek	6
• Volba infuzního systému.....	6
• Jak infuzní systém vypadá.....	7
• Základní informace o pumpě	8
• Použití infuzního systému	9
2. Jak se chránit před infekcí krevního řečiště.....	10
• Sledování případných známek infekce.....	10
• Mytí rukou.....	10
• Mytí rukou v šesti krocích.	11
• Čistá pracovní plocha	12
• Odběr a míchání přípravku	12
• Ochrana spojů před vlhkostí	13
• Použití konektorů s uzavřeným hrdlem	14
• Použití 0,2mikrometrových filtrů na hadičce.....	14
• Zakrytí vstupu hadičky krytím	15

1. Základní informace o léčbě

Podávaný přípravek

Přípravek, který budete podávat, obsahuje léčivou látku treprostinil. Dostáváte jej, protože máte vysoký tlak v plicních cévách. Tento problém se nazývá plicní arteriální hypertenze nebo také PAH.

Treprostinil je podáván hadičkou přímo do jedné z velkých žil. Tato hadička se nazývá centrální žilní katetr a nejčastěji se zavádí do žil na krku nebo na hrudníku.

K aplikaci přípravku se používá tzv. infuzní systém. Tato brožura je součástí výukové dokumentace určené k tomu, abyste se infuzní systém naučili používat.

Základní informace o přípravku naleznete v příbalové informaci umístěné v krabičce přípravku.


Volba infuzního systému

Lékař Vám pomůže s volbou optimálního typu infuzního systému. Tento přípravek možná budete používat řadu měsíců i let, takže je třeba, abyste se se systémem naučili dobře zacházet.

Než si začnete infuzi aplikovat sami doma, absolvujete zácvik v jejím provádění. Tuto metodu si musíte osvojit natolik, abyste ji pohodlně zvládli sami.

Pokud budete mít jakékoli dotazy, obraťte se kdykoli na svého lékaře či zdravotní sestru.

Jak infuzní systém vypadá



Příklad infuzního systému je znázorněn na předchozím obrázku. Je na něm infuzní hadička (centrální žilní katetr), zavedená do velké, hluboké žíly v hrudníku. Součástí systému je pumpa „Canè Crono Five“, zásobník na lék (stříkačka) a vřazený 0,2mikrometrový filtr. Tyto komponenty budou vysvětleny dále v této brožurce. Váš systém může mít odlišnou pumpu a součásti a tím i trochu jiný vzhled.

Základní informace o pumpě

Součástí infuzního systému je malá pumpa, která čerpá přípravek hadičkou do těla. Pumpa neustále tiše běží a dodává přípravek 24 hodin denně. Dva různé typy pumpy jsou popsány níže.

- Potřebné množství přípravku Vám sdělí lékař. Poví Vám také, jak na pumpě nastavit rychlosť infuze.
- Lék si připravíte a doplníte jej do zásobníku, který má kapacitu na jeden den (24 hodin). Zásobník s lékem a infuzní hadičku budete vyměňovat každých 24 hodin.
- Komponenty a lék na výměnu si připravujte těsně před uplynutím 24 hodin. Výměnu infuzního systému provádějte rychle, aby nedošlo k přerušení dodávky přípravku.
- Každý zásobník používejte pouze 24 hodin, i kdyby ještě nebyl prázdný. Po této době už přípravek není dost čerstvý.

Kompatibilní ambulantní pumpy:

Název: Canè Crono Five®

Způsob nošení: připevněná na opasku nebo zavěšená

Velikost: 77 x 47 x 29 mm, váha asi 115 g

Zásobník: přípravek je podáván z 20ml stříkačky



Název: CADD Legacy®

Způsob nošení: v taštičce u pasu nebo zavěšená přes rameno

Velikost: 112 x 97 x 41 mm, váha asi 391 g

Zásobník: přípravek je podáván z 50ml nebo

100ml kazety



Použití infuzního systému

Nevysazujte lék, dokud Vám to lékař nedoporučí. To proto, že může dojít k opětovnému probuzení nemoci (tzv."rebound" fenoménu). V takovém případě se může velmi rychle dostavit zhoršení zdravotního stavu, dušnost a závratě.

Chcete-li zajistit nepřetržitou funkci infuzního systému:

- denně kontrolujte, zda infuzní hadička není zalomená nebo nemá volné spoje
- před uvedením katetru do provozu zkонтrolujte, zda není uzavřen svorkou (pokud je jí systém vybaven).

Mějte také připravenou náhradní pumpu, zásobník, infuzní hadičku a konektor s uzavřeným hrdlem pro případ, že by došlo k nečekanému selhání některé z těchto komponent.

2. Jak se chránit před infekcí krevního řečiště

Zde si vysvětlíme několik zásad, jak předejít infekci krevního řečiště. Pokud se do krve dostanou bakterie, může tozpůsobit vážné onemocnění.

- Každá ze zásad má za cíl udržet infuzní systém co nejčistší.
- V rámci zaškolení se dozvíte, jak systém sestavit tak, abyste do něj nezanesli infekci.

Sledování případných známek infekce

Každý den kontrolujte, zda se neobjeví jakékoli známky infekce. Pokud ke kontrole musíte nadzvednout okraj krytí, vyměňte je.

Pokud se objeví jakákoli z následujících známek infekce, neprodleně informujte lékaře či zdravotní sestru:

- **pokožka kolem vstupu hadičky do těla je začervenalá, teplá nebo citlivá na dotek**
- **kolem vstupu hadičky vytéká tekutina nebo místo zapáchá**
- **horečka, zimnice, svalové bolesti (jako při chřipce)**
- **není vám celkově dobře.**

Mytí rukou


Před každodenní přípravou infuzního systému si musíte pečlivě umýt ruce.

Nejprve si sejměte veškeré náramky a prsteny.

- Umyjte si ruce antiseptickým tekutým mýdlem. Nepoužívejte pevné mýdlo (kostku) – na jeho povrchu mohou růst bakterie.
- Pokud antiseptické tekuté mýdlo a čistá tekoucí voda nejsou k dispozici, použijte dezinfekční gel s alkoholem.

Při mytí použijte následujících šest kroků:

- 1.** Vetřete si mýdlo do pokožky třením dlaní o sebe.



- 3.** Přiložte dlaně k sobě; prsty propleťte a sevřete. Třete o sebe dlaně pohybem ze strany na stranu.



- 5.** Zahákněte o sebe palce. Otáčením levého palce namydlete pravý. Opakujte v obráceném uspořádání.



- 2.** Umístěte pravou ruku přes hřbet levé a namydlete prostory mezi prsty. Vyměňte si ruce a postup opakujte.

Vyměňte ruce, dokud není mýdlo dobře zapracováno do pokožky.



- 4.** Rozpojte ruce. Sevřete pravačku v pěst a namydlete její klouby třením o levou dlaň.

Vyměňte si ruce a postup opakujte.



- 6.** Špičky prstů na pravé ruce vložte do levé dlaně a krouživými pohyby dlaň namydlete. Kroužení provádějte po směru hodinových ručiček a poté proti němu. Vyměňte si ruce a postup opakujte.



Oplachujte ruce tekoucí vodou od zápěstí až ke špičkám prstů přinejmenším po 20 sekund. Nikdy ruce nemáčejte do stojaté vody – mohou v ní růst bakterie. Osušte si ruce papírovými ručníky a přes ručník také zavřete kohoutek. Poté ručníky vyhodíte.

Čistá pracovní plocha

Zvolte místo obecně čisté, klidné a dostatečně vzdálené od domácích zvířat. Před otevřením obalů na potřebných komponentách očistěte pečlivě pracovní plochu a přípravné místo kapesníčky vlhčenými dezinfekční látkou.

Odběr a míchání přípravku


Zkontrolujte datum použitelnosti všech použitých komponent. Zkontrolujte také, zda jsou všechny kapaliny čiré a bez viditelných částic. Lahvičku s treprostinilem lze používat maximálně 30 dní po prvním použití.

- Tamponem namočeným v alkoholu očistěte pryžovou zátku na lahvičce.
- Zaveděte hrot jehly kousek do pryžové zátky pod úhlem 45°. Dbejte, aby „vykrojená“ část hrotu jehly směřovala nahoru.
- Poté napřimte jehlu až do kolmé polohy a plně penetrujte zátku. Tím zamezíte postupnému vytváření otvorů v zátce, kterými by se do přípravku mohly ze vzduchu dostat bakterie.
- Při přípravě léku se nedotýkejte spojů prsty.

Ochrana spojů před vlhkostí

Voda často obsahuje bakterie. To znamená, že musíte infuzní systém chránit před vodou.

- Pokud některé spoje zvlhnou, systém nerozebírejte. Nechte spoje, aby nejprve samy vyschly.
- Před mytím spoje obtočte vodotěsným materiélem. Tím zamezíte jejich navlhnutí. Po mytí a usušení vodotěsný materiál sejměte a vyhod'te.
- Infuzní systém nenamáčejte. Vyhněte se plavání.
- Před koupelí, sprchováním nebo plaváním systém neodpojujte.



Zakryjte systém a spoje vodotěsným krytím, aby nedošlo k navlhnutí.

Použití konektorů s uzavřeným hrdlem

Konektory s uzavřeným hrdlem se otevírají jen jedním směrem. Minimalizuje se tak otevření systému a jeho vystavení vzdušným bakteriím. Při každém vyjmutí hadičky konektor vyčistěte tamponem namočeným v alkoholu. Konektor s uzavřeným hrdlem měňte přinejmenším každých 7 dní.

Použití filtrů na hadičce

Některé hadičky jsou vybaveny filtrem odstraňujícím bakterie, které se dostanou do systému. Pokud na hadičce filtr instalován není, zapojte do systému mezi pumpu a konektor filtr (s póry o velikosti 0,2 mikrometru) ze soupravy. Ten se denně (každých 24 hodin) mění současně s hadičkou a zásobníkem léku.

Filtr 0,2 mikrometru



Zakrytí vstupu hadičky krytím

Pokožku kolem vstupu hadičky do těla mějte stále zakrytu krytím. Tak zůstane místo čisté, suché a bez bakterií. Krytí denně kontrolujte. Pokud zvlhne, uvolní se nebo dojde ke znečištění, neprodleně jej vyměňte.

Lze použít jeden ze dvou typů krytí:

- sterilní průhledné krytí z plastové fólie (vyměňuje se minimálně každých 7 dní)
- sterilní gázové krytí (vyměňuje se minimálně obden)

Průhledné krytí usnadňuje každodenní kontrolu. Pokud však dáváte přednost klasické gáze, můžete ji také použít.

Výzva k hlášení podezření na nežádoucí účinky

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků.

Podrobnosti o hlášení najdete na adrese:

<http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek>

Adresa pro zasílání je

Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance

Šrobárova 48, Praha 10, 100 41

e-mail: farmakovigilance@sukl.cz

Tato brožura Vám pomůže zvládnout práci s pumpou a přípravkem. Vezměte si ji domů a uchovávejte na bezpečném místě. Můžete si v ní připomínat nejdůležitější informace. Mohou se s ní seznámit i členové Vaší rodiny nebo pečovatel.

Pokud budete mít jakékoli dotazy, obraťte se kdykoli na svého lékaře či zdravotní sestru.