

# EZICLEN®

koncentrát pro perorální roztok

Natrii sulfas, magnesii sulfas a kalii sulfas

Lékař:

Datum:

Příchod v:

Místo:

Režim podání:

- JEDNODENNÍ PLÁN:  
Obě dávky den PŘED zákrokem
- DVOUDENNÍ PLÁN (S ROZDĚLENOU DÁVKOU):  
1. dávka den PŘED zákrokem;  
2. dávka v den zákroku

## ► DŮLEŽITOST DOSTATEČNÉ HYDRATACE

Protože průjem způsobuje dehydrataci, je velice důležité, abyste striktně dodrželi níže uvedené pokyny a vypili tolik dalších tekutin, kolik je nezbytné k udržení dostatečné hydratace.



### Můžete pít kteroukoli z následujících čirých tekutin:

Čiré tekutiny jako voda, čaj nebo káva (bez mléka nebo smetany bez obsahu mléka), nealkoholické nápoje bez červeného či růžového zbarvení (perlivé či neperlivé). Jsou povoleny slazené nápoje; perlivé či neperlivé nealkoholické nápoje, ovocné šťávy (**bez obsahu** dužiny), bujóny nebo čiré polévky nebo polévky scezené, zbavené jakýchkoli pevných částic



### NEPIJTE:









Mléko, červeně či růžově zbarvené nápoje, alkoholické nápoje, ovocné šťávy nebo nápoje s dužinou.

## JAK SE PŘIPRAVIT NA ZÁKROK

Pro zajištění efektivního vyčištění střev a tím i úspěšného zákroku je nezbytné, abyste striktně dodrželi následující instrukce. Den před zákrokem si můžete dát lehkou snídani; poté již přijímejte **POUZE** čiré tekutiny namísto oběda, večeře či jakéhokoli jiného jídla a to až do provedení zákroku.

## JAK UŽÍT EZICLEN® ?

Příprava s přípravkem Eziclen® spočívá v užití 2 dávek následujícím způsobem:

datum		začátek podání:	
► 1. dávky:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>1.hodina</b>		<b>2.hodina</b>	
			
Nalijte obsah <b>jedné lahve přípravku Eziclen®</b> do odměrky.	Přidejte k přípravku tolik <b>vody</b> , aby hladina dosáhla rýsky na odměrce.	Během následující <b>půl hodiny až hodiny</b> vypijte veškerý roztok z odměrky.	<b>DŮLEŽITÉ</b> V průběhu následující hodiny postupně vypijte další 2 odměrky naplněné vodou (nebo jinou čirou tekutinou).
datum		začátek podání:	
► 2. dávky:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>1.hodina</b>		<b>2.hodina</b>	
			
Nalijte obsah <b>druhé lahve přípravku Eziclen®</b> do odměrky.	Přidejte k přípravku tolik <b>vody</b> , aby hladina dosáhla rýsky na odměrce.	Během následující <b>půl hodiny až hodiny</b> vypijte veškerý roztok z odměrky.	<b>DŮLEŽITÉ</b> V průběhu následující hodiny postupně vypijte další 2 odměrky naplněné vodou (nebo jinou čirou tekutinou).

Poznámka:

- V případě, že nebude provedena anestezie, musíte ukončit příjem veškerých tekutin nejméně jednu hodinu před začátkem zákroku.
- V případě, že bude provedena anestezie, musíte ukončit příjem veškerých tekutin obvykle nejméně 2 hodiny před začátkem zákroku, podle pokynů anesteziologa.





## PŘEČTĚTE SI POZORNĚ CELOU PŘÍBALOVOU INFORMACI DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE TENTO PŘÍPRAVEK UŽÍVAT

Nezapomeňte vyplnit tento formulář a přinést jej v den zákroku zpět Vašemu lékaři.

Niže uvedená tabulka vám pomůže kontrolovat, že postupujete správně podle instrukcí a zajistit tak kvalitní přípravu. Zaznamenejte, prosím, datum podání přípravku a čas jednotlivých podání uvedených v tabulce.





### Měl/a byste vypít všechny přípravek a doplňující tekutiny.

► Datum 1.DÁVKY:

KROK	  	ČAS PODÁNÍ
<b>Začátek léčby: KROKY 1 – 3</b> Nalijte obsah jedné lahve přípravku Eziclen® do odměrky a přidejte tolik <b>vody</b> , aby hladina dosáhla rysky na odměrce.		Čas podání <b>první</b> dávky naředěného přípravku Eziclen®: <input type="text"/>
<b>Podání doplňující vody nebo jiné čiré tekutiny: KROK 4</b> 2x odměrka naplněná <b>vodou</b> nebo jinou povolenou čirou tekutinou		Čas podání <b>první</b> odměrky s vodou (nebo jinou čirou tekutinou): <input type="text"/> Čas podání <b>druhé</b> odměrky s vodou (nebo jinou čirou tekutinou): <input type="text"/>

VYPIL(A) JSTE VŠECHEN PŘÍPRAVEK?	
<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
Pokud <b>NE</b> , uveďte přibližné vypité množství: <input type="text"/>	
Čiré tekutiny, které zajistí vaši dostatečnou hydrataci	
DRUH POUŽITÉ TEKUTINY	VYPIL(A) JSTE CELÝ OBSAH ODMĚRKY?
<b>První odměrka</b>	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne Pokud <b>NE</b> , uveďte přibližné vypité množství: <input type="text"/>
<b>Druhá odměrka</b>	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne Pokud <b>NE</b> , uveďte přibližné vypité množství: <input type="text"/>

► Datum 2.DÁVKY:

KROK	  	ČAS PODÁNÍ
<b>Druhá část léčby: ZOPAKUJTE KROKY 1 - 3</b> Nalijte obsah druhé lahve přípravku Eziclen® do odměrky a přidejte tolik <b>vody</b> , aby hladina dosáhla rysky na odměrce.		Čas podání <b>druhé</b> dávky naředěného přípravku Eziclen®: <input type="text"/>
<b>Podání doplňující vody nebo jiné čiré tekutiny: KROK 4</b> 2x odměrka naplněná <b>vodou</b> nebo jinou povolenou čirou tekutinou		Čas podání <b>první</b> odměrky s vodou (nebo jinou čirou tekutinou): <input type="text"/> Čas podání <b>druhé</b> odměrky s vodou (nebo jinou čirou tekutinou): <input type="text"/>

VYPIL(A) JSTE VŠECHEN PŘÍPRAVEK?	
<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
Pokud <b>NE</b> , uveďte přibližné vypité množství: <input type="text"/>	
Čiré tekutiny, které zajistí vaši dostatečnou hydrataci	
DRUH POUŽITÉ TEKUTINY	VYPIL(A) JSTE CELÝ OBSAH ODMĚRKY?
<b>První odměrka</b>	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne Pokud <b>NE</b> , uveďte přibližné vypité množství: <input type="text"/>
<b>Druhá odměrka</b>	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne Pokud <b>NE</b> , uveďte přibližné vypité množství: <input type="text"/>

Po zákroku: Abyste nahradil(a) tekutinu ztracenou během přípravy na zákrok, vypijte dostatečné množství tekutin, aby byla zachována dostatečná hydratace.