

# EDUKAČNÍ MATERIÁL

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PŘEDEPISUJÍCÍ LÉKAŘE SLOUŽÍCÍ K MINIMALIZACI RIZIK PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKU EMERADE®

## KONTROLNÍ SEZNAM PRO PŘEDEPISUJÍCÍHO LÉKAŘE

Jste předepisující lékař adrenalinového autoinjektoru **Emerade®**, který je indikován k léčbě anafylaxe. Tento kontrolní seznam vám pomůže poskytnout pacientům veškeré informace o **správném použití a skladování adrenalinového pera Emerade®**.

### PACIENT SI JE VĚDOM

**POTŘEBY MÍT U SEBE PO CELOU DOBU JEDNO NEBO DVĚ ADRENALINOVÁ PERA EMERADE® DLE DOPORUČENÍ LÉKAŘE.**

**KDY MUSÍ POUŽÍT PERO EMERADE®:**

Kterýkoli z následujících příznaků může naznačovat, že Vy / Vaše dítě / kdokoli jiný máte anafylaktickou reakci a naléhavě potřebujete injekci adrenalinu.

<b>Kožní projevy</b>	▶ svědění – zarudnutí nebo kopřivka kdekoliv na těle
<b>Problémy dýchacích cest</b>	▶ otok jazyka – otok krku – potíže s polykáním
<b>Dýchací potíže</b>	▶ obtížné dýchání/hlasité dýchání - sípání a/nebo přetrvávající kašel
<b>Snížený pocit vědomí</b>	▶ mdloby - závratě - zmatenost - ztráta vědomí - bledost a slabost (u malých dětí)

**JAK POUŽÍT PERO EMERADE®:**

Pacienti, rodinní příslušníci a učitelé by měli být poučeni, jak správně používat autoinjektor



**ODSTRAŇTE**  
kryt jehly



**ZATLAČTE** proti vnější straně stehna a držte **5 VTEŘIN**.

- > Emerade® aplikujte pouze do vnější strany stehna
- > Jemně masírujte místo vpichu
- > Zavolejte na říšňovou linku 155 a nahlašte, že se jedná o anafylaktický šok

Pokud po podání nedojde ke zlepšení stavu pacienta, je možné po 5-15 minutách aplikovat druhou injekci nepoužitým perem Emerade®.



## JAKOU DÁVKU EMERADE® JSEM PŘEDEPSAL(A) A BAREVNÉ ROZLIŠENÍ DÁVEK:

150 µg



300 µg



500 µg



Dávka Emerade® závisí na **tělesné hmotnosti pacienta** a **může být potřeba ji upravit v případě, že se tělesná hmotnost pacienta zvýší nebo sníží.**  
Váží pacient méně než 15 kg, mezi 15 kg a 30 kg nebo více než 30 kg?



## JAK UCHOVÁVAT EMERADE® :

- Uchovávejte při teplotě do 25°C.
- Chraňte před mrazem.
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku.
- Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Zlikvidujte Emerade® a vyměňte ho za nové po uplynutí doby použitelnosti.
- Pravidelně kontrolujte roztok přes kontrolní okénko zvednutím štítku, abyste se přesvědčili, že je čirý a bezbarvý. Nepoužívejte pero Emerade® a vyměňte ho za nové, pokud roztok změní barvu nebo obsahuje sraženiny.
- Zkontrolujte autoinjektor, pokud upadne na zem. Pokud je poškozen nebo léčivá látka vytekla, vyměňte jej.
- Neodstraňujte kryt jehly, pokud nepotřebujete pero použít.
- Uchovávejte Emerade® v původním obalu
- Uchovávejte tréninkové pero odděleně od předplněného pera, aby nedošlo k záměně.



## PACIENT OBRŽEL TRÉNINKOVÉ PERO EMERADE® A INFORMAČNÍ BROŽURU.



## PORADIL(A) JSEM PACIENTOVI, ABY NAVŠTÍVIL WEBOVOU STRÁNKU [WWW.EMERADE.CZ](http://WWW.EMERADE.CZ), KDE SI MŮŽE SPUSTIT INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO, JAK SPRÁVNĚ POUŽÍVAT EMERADE®

Pokud se u Vás vyskytnou kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: [www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek](http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek), email: [farmakovigilance@sukl.cz](mailto:farmakovigilance@sukl.cz).