

Údaje o léčbě rituximabem

Název užívaného léčivého přípravku (doplňí lékař)

První dávka:

Poslední dávka:

- Více údajů naleznete v příbalové informaci přípravku, kterou lze vyhledat na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv v databázi léků
<http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php> po zadání názvu přípravku
- Mějte s sebou při každé návštěvě lékaře také seznam všech ostatních léků, které užíváte.

Jméno pacienta: _____

Jméno lékaře : _____

Telefon lékaře : _____

- VZHLEDEM K TOMU, ŽE OSLABENÍ IMUNITNÍHO SYSTÉMU ZPŮSOBENÉ RITUXIMABEM MŮŽE PŘETRVÁVAT PO DOBU NĚKOLIKA MĚSÍCŮ, MŮŽE DOJÍT K PROJEVŮM NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ I PŘESTO, ŽE LÉČBA BYLA UKONČENA. Z TOHOTO DŮVODU NOSTE, PROSÍM, TUTO KARTU U SEBE PO DOBU 24 MĚSÍCŮ PO POSLEDNÍ DÁVCE.

Karta pro pacienta s jiným než onkologickým onemocněním léčeného rituximabem

Tato karta pro pacienta obsahuje důležité bezpečnostní informace, které byste měl(a) znát před zahájením léčby léčivým přípravkem obsahujícím rituximab.

- Ukažte tuto kartu každému lékaři, nejen svému ošetřujícímu specialistovi a také lékárníkovi, nebo zdravotní sestře, a při jakékoli návštěvě zdravotního zařízení.

Některé z léčivých přípravků obsahujících rituximab podléhají následnému sledování, což je vyznačeno přítomností symbolu obráceného černého trojúhelníku na balení a textech doprovázejících léčivý přípravek následujícím způsobem:

▼ *Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.*

Infekce

Rituximab může zvyšovat riziko vzniku infekcí.

Před zahájením léčby rituximabem

- Léčba nesmí být zahájena, pokud trpíte závažnou infekcí nebo máte závažné problémy s imunitním systémem.
- **UPOZORNĚTE SVÉHO LÉKAŘE, POKUD UŽÍVÁTE NEBO JSTE V MINULOSTI UŽÍVAL(A) LÉKY, JAKO JE CHEMOTERAPIE NEBO IMUNOSUPRESIVA, KTERÉ BY MOHLY OVLIVNIT VÁŠ IMUNITNÍ SYSTÉM.**

V průběhu nebo po ukončení léčby rituximabem

Pokud se u Vás rozvinou příznaky připomínající infekce, jako je například horečka, přetrvávající kašel, úbytek hmotnosti nebo apatie, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

U některých pacientů užívajících rituximab se velmi vzácně objevila závažná mozková infekce nazývaná progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML), která může vést k těžké invaliditě nebo úmrtí. Příznaky PML mohou zahrnovat poruchy paměti, poruchy myšlení, problémy s chůzí a/ nebo poruchy či ztrátu vidění. **V případě, že zaznamenáte kterýkoliv z těchto příznaků, informujte okamžitě svého lékaře.**