

Ukažte tuto kartu každému zdravotnickému pracovníkovi, který se podílí na vaší lékařské péči – například i svému zubnímu lékaři nebo při návštěvě pohotovosti.

▼ Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Můžete je také nahlásit přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, email: farmakovigilance@sukl.cz nebo společnosti AbbVie na safety-cz@abbvie.com.

Vaše jméno:

.....

Jméno lékaře, který předepsal přípravek RINVOQ®:

.....

Telefonní číslo lékaře:

.....

Datum, kdy jste začali užívat přípravek RINVOQ®:

.....

Verze 1.0. Datum schválení 17. října 2019.
Schválené SÚKL v květnu 2020



CZ-RNQR-200003

abbvie

Karta pacienta Tuto kartu mějte vždy u sebe

Bezpečnostní informace o přípravku RINVOQ® ▼ (upadacitinib) pro pacienty

- Tato karta obsahuje důležité bezpečnostní informace, které byste měli vědět – před léčbou a během léčby přípravkem RINVOQ®.
- Pro více informací si přečtěte příbalovou informaci, která je součástí každého balení léčivého přípravku a lze ji také vyhledat na adrese <http://www.olecich.cz> nebo oskenováním QR kódu na www.rinvoq.eu.

Riziko infekcí

Přípravek RINVOQ® může zhoršit stávající infekci nebo zvýšit pravděpodobnost, že dostanete novou infekci, jako například tuberkulózu (TBC), pásový opar nebo virovou hepatitidu.

Informujte ihned svého lékaře, pokud zpozorujete známky infekce, jako například:

- Horečka, pocení, zimnice, úbytek hmotnosti nebo kašel, který neodeznívá, mohou to být známky TBC.
- Bolestivá kožní vyrážka s puchýři, může to být známka pásového oparu.
- Pocit únavy nebo dušnost, může to být známka zánětu plic.

Očkovací látky – používané pro prevenci infekcí

Živé očkovací látky (například očkovací látka proti chřipce ve formě nosního spreje) se nesmí podávat během léčby nebo bezprostředně před zahájením léčby přípravkem RINVOQ®.

Před očkováním se poraďte se svým lékařem – bude vědět, které vakcíny by vám neměly být podány před léčbou nebo během léčby přípravkem RINVOQ®.

Cholesterol

Během užívání přípravku RINVOQ® Vám bude lékař kontrolovat hladiny cholesterolu a rozhodne, zda je nutné zahájit užívání léku na jejich snížení.

Antikoncepce, těhotenství a kojení

Přípravek RINVOQ® se nesmí užívat během těhotenství.

- Během užívání přípravku RINVOQ® – a 4 týdny po Vaší poslední dávce – používejte účinnou antikoncepci. O účinné antikoncepci se poraďte se svým lékařem.
- Pokud budete chtít otěhotnět nebo pokud jste těhotná, informujte ihned svého lékaře.
- Během užívání přípravku RINVOQ® nekojte.

Krevní sraženiny v žilách nebo plicích

Informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví známky krevních sraženin v žilách nebo plicích, jako jsou bolest a otoky nohou nebo bolest na hrudi.