


Příručka pacienta pro přípravu dávky přípravku Sodium oxybate Kalceks

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti najdete na: <http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek>. Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, odbor farmakovigilance, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, email: farmakovigilance@sukl.cz.

Krabička s přípravkem Sodium oxybate Kalceks obsahuje jednu láhev perorálního roztoku Sodium oxybate Kalceks, zatačovací adaptér do lahve, kalibrovanou odměrnou stříkačku a dvě dávkovací nádoby s dětskými bezpečnostními šroubovacími uzávěry pro přípravu a uchování dvou dávek na noc, a příbalovou informaci pro Sodium oxybate Kalceks.



Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete Sodium oxybate Kalceks užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte Sodium oxybate Kalceks přesně podle pokynů svého lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky nebo pochybnosti týkající se užívání přípravku Sodium oxybate Kalceks, zeptejte se svého lékaře.

Příprava Sodium oxybate Kalceks

Obě dávky je nutno připravit před spaním.

Krok 1 (obr. 1)

Odstraňte uzávěr láhve zatlačením dolů a současným otáčením uzávěru proti směru hodinových ručiček (doleva). Po odstranění uzávěru postavte láhev na desku stolu. Držte láhev ve svislé poloze a zasuňte zatlačovací adaptér do jejího hrdla. To je zapotřebí udělat pouze při prvním otevření láhve. Adaptér se pak ponechá v láhvi pro všechna další použití.

Obr. 1



Krok 2 (obr. 2)

Poté zasuňte hrot odměrné stříkačky do středu otvoru láhve a pevně ji zatlačte (viz obrázek 2). Ujistěte se, že je odměrná stříkačka dobře upevněna.


Obr. 2



Krok 3 (obr. 3)

Pro naplnění stříkačky **otočte láhev dnem vzhůru**. Zatímco držíte stříkačku na místě, opatrně vytáhněte píst směrem dolů a natáhněte předepsanou dávku léku (viz obrázek 3).

Obr. 3



Krok 4 (obr. 4)

Otočte láhev správným směrem nahoru. Vyjměte stříkačku ze středového otvoru láhve. Zatlačením na píst vyprázdněte lék ze stříkačky do jedné z dávkovacích nádobek, které jsou přiloženy (viz obrázek 4). Zopakujte tento postup i pro druhou dávkovací nádobku. Pak do každé dávkovací nádobky přidejte asi 60 ml vody (60 ml jsou asi 4 polévkové lžíce).

Obr. 4



Krok 5 (obr. 5)

Umístěte přiložené uzávěry na dávkovací nádobky a otočte každý uzávěr ve směru hodinových ručiček (doprava), dokud nezaklapne a nezajistí se v poloze chránící před otevřením dětmi (viz obrázek 5). Stříkačku propláchněte vodou.

Obr. 5



Krok 6

Těsně před tím, než půjdete spát, dejte si druhou dávku k posteli. Možná bude nutné, abyste si nařídil(a) budík, abyste se na druhou dávku vzbudil(a) nejdříve 2,5 hodiny a nejpozději 4 hodiny po první dávce.

Odstraňte uzávěr z první dávkovací nádobky zatlačením na dětský bezpečnostní uzávěr a otočením uzávěru proti směru hodinových ručiček (doleva). Vsedě na posteli vypijte celou první dávku, uzavřete nádobku víčkem a ihned si lehněte do postele.

Krok 7

Když se o 2,5 až 4 hodiny později probudíte, odstraňte uzávěr z druhé dávkovací nádobky. Vsedě na posteli vypijte celou druhou dávku těsně předtím, než si lehnete do postele a budete pokračovat ve spánku. Zavřete uzávěr na druhé nádobce.

Další podrobnosti k informacím obsaženým v této příručce naleznete v příbalové informaci vložené v krabičce přípravku Sodium oxybate Kalceks nebo se zeptejte svého lékaře nebo lékárníka.